

傷

寒

論

傷寒論卷第四

漢張仲景著

晉王叔和撰次

宋成無己註

錢塘張卿子參

辨太陽脉證分治下第七

問曰病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胸也何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治。

結胸者邪結在胸藏結者邪結在藏二者皆下後

邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與陽相結者  
爲結胸以陽受氣於胸中故爾與陰相結者爲祿  
結以陰受之則入五藏故爾氣宜通而寒故痛邪  
結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得  
下通是二者皆心下鞭痛寸脉浮關脉沉知邪結  
在陽也寸脉浮關脉小細沉緊知邪結在陰也陰  
結而陽不結雖心下結痛飲食亦自如故陰氣乘  
腸虛而下故時時自下利陰得陽則解藏結得熱  
證多則易治舌上白胎滑者邪氣結胸中亦寒故

云難治

王宇泰云按本文云如結胸狀則與結胸當有分別矣註曰是二者皆心下鞭痛久穩當如結胸狀飲食如故只是按之不痛耳既結於藏而舌白胸又爲胸寒外證上下俱病故難治也

藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

藏結於法當下無陽證爲表無熱不往來寒熱爲半表半裏無熱其人反靜爲裏無熱經曰舌上如

胎者以丹田有熱胸中有寒以表裏皆寒故不可  
攻。

病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反  
下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也

發熱惡寒者發於陽也而反下之則表中陽邪入  
裏結於胸中爲結胸無熱惡寒者發於陰也而反  
下之表中陰邪入裏結於心下爲痞。

張兼善云或謂成註無熱而惡寒者發於陰也。經  
無熱而惡寒爲陰證安可有下之理又豈止作痞

而已哉夫仲景所謂陰陽者指表裏而言也病在表則當汗而反下之因作結胸病在裏尚未入府而輒下之因作痞所以成結胸與痞者下之太早故也

又云風邪入裏則結胸寒邪入裏則為痞然此皆太陽病之所致非陰證之所為也

結胸者項亦強如柔瘥狀下之則和宜大陷胸丸

結胸病項強者為邪結胸中胸膈結滿心下緊實但能仰而不能俛是項強亦如柔瘥之狀也與大

附胸丸下結泄瀉。

大附胸丸方 第四十九

大黃 半斤 味苦寒

葶藶 半升 味苦寒

芒硝 半升 味鹹寒

杏仁 半升 去皮尖 熬黑 味苦其溫

右四味搗篩二味內杏仁末令研如脂和散取如彈丸一枚別搗其遂末一錢七白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法。

大黃芒硝之苦熱所以下熱葶藶杏仁之苦其所以

以泄滿其遂取其直達白竅取其潤利皆以下泄滿實物也。

結胸證其脉浮大者不可下下之則死。

結胸爲邪結胸中屬上焦之分得寸脉浮關脉沉者爲在裏則可下若脉浮大心下雖結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣復結則難可制故云下之則死。

結胸證悉具煩躁者亦死。

結胸證悉具邪結已深也煩躁者正氣散亂也邪

氣勝正病者必死。

太陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛。數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也。醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞅則爲結胸大陷胸湯主之。若不結胸但頭汗出餘無汗刻頸而還小便不利身必發黃也。

動數皆陽脉也。當責邪在表。睡而汗出者謂之盜汗。爲邪氣在半表半裏。則不惡寒。此頭痛發熱微

盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之  
虛其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脈邪在  
裏則見陰脈邪氣內陷動數之脈所以變遲而浮  
脈獨不變者以邪結胸中上焦陽結脈不得而沉  
也客氣者外邪乘胃中空虛入裏結於胸膈膈中  
拒痛者客氣動膈也金匱要畧曰短氣不足以息  
者實也短氣燥煩心中懊憹皆邪熱爲實陽氣內  
陷氣不得通于膈壅於心下爲鞭滿而痛成結胸  
也與大陷胸湯以下結熱若胃中空虛陽氣內陷

不結於胸膈下入於胃中者。遍身汗出則爲熱。越不能發黃。若但頭汗出身無汗。刺頸而還。小便不利者。熱不得越。必發黃也。

大陷胸湯方 第五十

大黃 六兩 去皮 苦寒 芒硝 一升 酸寒 甘遂 一錢 苦寒

右三味以水六升。先煮大黃取二升。去滓。內芒硝。煮一兩沸。內甘遂末。溫服一升。得快利。止後服。

大黃謂之將軍。以苦蕩滌。芒硝一名硝石。以其鹹能更鞭。夫間有遂以通水也。甘遂若夫間之遂。其

氣可以直達透結。陷胸三物爲允。

王宇泰云。低者舉之。高者陷之。以平爲正。結胸爲高邪。陷下以平之。故曰陷胸。利藥之中。此峻劑也。傷寒錯惡。結胸爲甚。非此不能通利。劑大而數少。須其迅速。分解邪結也。

朱丹溪云。此證經曰。胃中空虛。曰短氣。躁煩。曰脉浮。此湯不可輕用。

傷寒六七日。結胸熱實。脉沉而緊。心下痛。按之石韌者。大陷胸湯主之。

病在表而下之熱入因作結胸。此不云下後而云傷寒六七日。則是傳裏之實熱也。沉爲在裏。緊爲裏實。以心下痛按之實鞭。是以爲結胸。與大陷胸湯以下結熱。

張兼善云。經言所以成結胸者。以下之太早故也。此不云下後。則云傷寒六七日。結胸熱實。此亦不因下早而結胸者何也。夫下早。結胸事之常。熱實結胸。事之變。其熱實傳裏爲結胸。乃法之開防不盡者。故仲景述其證以註方於其下也。於此可見。

古人用心，曲盡其妙。且如下章以水結胸脇，但頭汗出者，以大陷湯主之，亦在常法之外。故條列其證，以彰其理。七亦或其人本虛，或曾吐下，而裏氣弱，外邪因入，故自爲結胸者也。然所入之因不同，其證治則一理而已。

傷寒十餘日，熱結在裏，復往來寒熱者，與大柴胡湯。但結胸無大熱者，此爲水結在胸脇也。但頭微汗出者，大陷胸湯主之。

傷寒十餘日，熱結在裏，是可下之證。復往來寒熱。

爲正邪分爭。未全飲結。與大柴胡湯下之。但結胸無大熱者。非熱結也。是水飲結於胸膈。謂之水結胸。周身汗出者。是水飲外散則愈。若但頭微汗出。餘處無汗。是水飲不得外泄。停蓄而不行也。與大陷胸湯以逐其水。

活人云。水結胸。小半夏加茯苓湯。小柴胡去牡蠣湯。亦主之。

太陽病重發汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至少腹鞭滿而痛。不可

近者大陷胸湯主之。

重發汗而復下之。則內外重亡津液。而邪熱內結。致不大便五六日。舌上燥而渴也。日晡潮熱者。屬胃。此日晡小有潮熱。非但在胃。從心下至少腹。硬滿而痛。不可近者。是一腹之中。上下邪氣俱甚也。與大陷胸湯以下其邪。

小結胸病正在心下。按之則痛。脈浮滑者。小陷胸湯主之。

心下鞭痛。手不可近者。結胸也。正在心下。按之則

痛是熱氣猶淺謂之小結胸結胸脈沉緊或寸浮關沉今脈浮滑知熱未深結與小陷胸湯以除胸膈上結熱也。

王字泰云上文云鞭滿而痛不可近者是不待按而亦痛也此云按之則痛是手按之然後作痛耳上文云至少腹是通一腹而言之此云正在心下則少腹不鞭痛可知矣熱微于前故云小結胸也。

### 小陷胸湯方

第五十一

黃連

一兩 苦寒。

半夏

半升 洗 辛溫。

栝實

大者一個 味苦寒。

右三味。以水六升。先煮括蕪。取三升。去滓。內諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。

苦以泄之。辛以散之。黃連括蕪實苦寒。以泄熱。半夏之辛。以散結。

王海藏云。大陷胸治熱實。大陷胸丸兼喘。小陷胸治痞。

太陽病。二三日不能臥。但欲起。心下必結。脈微弱者。此本有寒分也。反下之。若利止。必作結胸。未止者。四日復下之。此作協熱利也。

太陽病。二三日邪在表也。不能卧。但欲起。心下結者。以心下結滿。卧則氣壅而愈甚。故不能卧。而但欲起也。心下結滿。有水分。有寒分。有氣分。今脈微弱。知本有寒分。醫見心下結而反下之。則太陽表邪乘虛入裏。利止則邪氣留結。爲結胸。利不止。至次日復如前。下利不止者。是邪熱下攻腸胃。爲挾熱利也。

太陽病。下之。其脈促。不結胸者。此爲欲解也。脈浮者。必結胸也。脈緊者。必咽痛。脈弦者。必兩脇拘急。脈細

數者頭痛未止。脉沉緊者必欲嘔。脉沉滑者協熱利。脉浮滑者必下血。

此太陽病下之後邪氣傳變其脉促者爲陽若下後脉促爲陽勝陰也故不作結胸爲欲解下後脉浮爲上焦陽邪結而爲結胸也經曰結胸者寸脉浮關脉沉下後脉緊則太陽之邪傳於少陰經曰脉緊者屬少陰內經曰邪客於少陰之絡令人噤痛不可內食所以脉緊者必咽痛脉弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽受病也其脉

循臟絡於耳。所以脈弦者，必兩脇俱急。下後邪氣傳裏，則頭痛當止。脈細數爲邪未傳裏而傷氣也。細爲氣少，數爲在表，故頭痛未止，脈沉緊則太陽之邪傳於陽明爲裏實也。沉爲在裏，緊爲裏實。陽明裏實，故必欲嘔。脈滑則太陽之邪傳於腸胃，以滑爲陰氣有餘，知邪氣入裏，干於下焦也。沉爲血勝，氣虛是爲協熱利。浮爲氣勝，血虛是知必下血。經曰：不宜下而便攻之，諸變不可勝數。此之謂也。病在陽，應以汗解之，反以冷水噴之，若灌之，其熱被

却不得去，彌更益煩。肉上粟起，意欲飲水，反不渴者，服文蛤散。若不差者，與五苓散。寒實結胸，無熱證者，與三物小陷胸湯。白散亦可服。

病在陽，爲邪在表也。法當汗出而解，反以冷水噴之，灌洗，熱被寒水，外不得出，則反攻其裏，彌更益煩。肉上粟起者，水寒之氣客於皮膚也。意欲飲水者，裏有熱也。反不渴者，寒在表也。與文蛤散以散表，中水寒之氣。若不差，是水熱相搏，欲傳於裏，與五苓散發汗以和之。始熱在表，因水寒制之，不得

外泄內攻於裏結於胸膈心下鞅痛本是水寒伏  
熱爲實故謂之寒實結胸無熱證者外無熱而熱  
悉收斂於裏也與小陷胸湯以下逐之白散下熱  
故亦可攻

文蛤散方

第五十二

文蛤

五兩味鹹寒

右一味爲散以沸湯和一錢七服湯用五合。  
鹹走腎邪可以勝水氣。

白散方

第五十三

桔梗

二分。味辛。苦。微溫。

芭豆

一分。去皮。心。熬。黑。研如脂。平溫。

貝母

三分。味辛。苦。平。

右件三味為末。內芭豆更於白中杵之。以白飲和服。強人半錢。羸者減之。病在膈上必吐。在膈下必利。不利。進熱粥一杯。利過不止。進冷粥一盃。身熱皮粟。不得解。欲引衣自覆者。若以水啜之。洗之。益令熱。那不得出。當汗而不汗。則煩。假令汗出已。腹中痛。與芍藥二兩如上法。

辛散而苦泄。桔梗貝母之苦辛。用以下氣。芭豆之

辛用以散實。

王守泰云、右熱實、結胸、及寒實、結胸、活人不拘寒熱、但用陷胸湯、不瘥者、用枳實理中丸、應手而愈。太陽與少陽併病、頭項強痛、或眩暈、時如結胸、心下痞鞭者、當刺大椎第一間、肺俞、肝俞、慎不可發汗。發汗則譫語、脈弦、五六日、譫語不止、當刺期門。

太陽之脈、絡頭下項、頭項強痛者、太陽表病也。少陽之脈、循胸絡脇、如結胸、心下痞鞭者、少陽裏病也。太陽少陽相併為病、不純在表、故頭項不但強

痲而或眩冒亦未全入裏故時如結胸。心下鞭痞。此邪在半表半裏之間也。刺大椎第一間肺俞。以瀉太陽之邪。刺肝俞。以瀉少陽之邪。邪在表則可發汗。邪在半表半裏則不可發汗。發汗則亡津液。損動胃氣。少陽之邪因干於胃。土爲木刑。必發譫語。脈弦至五六日。傳經盡。邪熱去。而譫語當止。若復不止。爲少陽邪熱甚也。刺期門。以瀉肝膽之氣。婦人中風發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除而脈遲。身涼。胸脇下滿。如結胸狀。譫語者。此爲熱入血

室也。常刺期門，隨其實而瀉之。

中風發熱惡寒表病也。若經水不來，表邪傳裏，則入府而不入血室也。因經水適來，血室空虛，至七八日邪氣傳裏之時，更不入府，乘虛而入於血室。熱除脉遲身涼者，邪氣內陷而表證罷也。胸脇下滿如結胸狀，譏語者，熱入血室而裏實。期門者，肝之募，肝主血，刺期門者，瀉血室之熱，審看何經氣實，更隨其實而瀉之。

許學士云：婦人平居水當養于木，血當養於肝。方

未受孕則下行以爲月水。旣妊則中畜以養胎。及已產則上壅以爲乳。皆此血也。今邪氣畜血併結肝經。聚于膻中。結於乳下。故手觸之則痛。非湯劑可及。故當刺期門。

婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。

中風七八日。邪氣傳裏之時。本無寒熱。而續得寒熱。經水適斷者。此爲表邪乘血室虛。入於血室。與

血相搏而血結不行。經水所以斷也。血氣與邪相  
爭。致寒熱如瘧。而發作有時。與小柴胡湯以解傳  
經之邪。

王三陽云。經水適來。血虛甚矣。而邪氣入之。熱除  
身涼。胸滿譏語者。則邪盡入裏。裏有實邪。又難下。  
故刺以瀉之。經水適斷。則血尚未盡。爲邪熱相搏  
而結之不行。續得寒熱發作有時。邪在半表半裏。  
故用小柴胡湯以徹其邪也。

婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則譏語。如見

鬼狀者。此爲熱入血室。無犯胃氣。及上二焦。必自愈。  
傷寒發熱者。寒已成熱也。經水適來。則血室虛空。  
邪熱乘虛入於血室。若晝日譫語。爲邪客於府。與  
陽爭也。此晝日明了。暮則譫語。如見鬼狀。是邪不  
入府。入於血室。與陰爭也。陽盛譫語。則宜下。此熱  
入血室。不可與下藥。犯其胃氣。熱入血室。血結寒  
熱者。與小柴胡湯。散邪發汗。此雖熱入血室。而不  
留結。不可與發汗藥。犯其上焦。熱入血室。胸脇滿。  
如結胸狀者。可刺期門。此雖熱入血室。而無滿結。

不可刺期門。犯其中焦，必自愈者，以經行則熱騰，血去。血下也。已則邪熱悉除而愈矣。所爲發汗爲犯上焦者，發汗則動衛氣，衛氣出上焦故也。刺期門爲犯中焦者，刺期門則動榮氣，榮氣出中焦故也。脉經曰：無犯胃氣及上二焦，必自愈，豈謂藥不謂針耶。

王宇泰云：犯胃氣謂下之，犯上二焦謂發汗也。傷寒六七日發熱微惡寒，支節煩疼，微嘔，心下支結，外證未去者，柴胡加桂枝湯主之。

傷寒六七日。邪當傳裏之時。支散也。嘔而心下結者。裏證也。法當攻裏。發熱微惡寒。支節煩疼。爲外證未去。不可攻裏。與柴胡桂枝湯以和解之。  
王宇泰云。支節猶云枝節。古字通也。支結。謂支撐而結。若訓作散。則不能結也。南陽云。外證未解。心下妨悶者。非痞也。謂之支結。

柴胡桂枝湯方

第五十四

桂枝 去皮。

黃芩

人參

各一兩半

甘草

一兩。

半夏

二合。

芍藥

一兩。

大棗

六枚

生薑

一兩

柴胡

四兩

右九味以水七升。煮取三升。去滓。溫服。

婁氏云。病雖屬太陽表證。而有裏證兼之者。則不言太陽病。但稱表不解。外證未去。其兼心下支結。則此條柴胡桂枝湯是也。

傷寒五六日。已發汗而復下之。胸脇滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。此為未解也。柴胡桂枝乾薑湯主之。

傷寒五六日。已經汗下之後。則邪當解。今胸脇滿。

微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者卽邪氣猶在半表半裏之間爲未解也胸膈滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消津液令小便不利而渴者其人必嘔今渴而不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而餘處無汗者津液不足而陽虛於上也與柴胡桂枝乾薑湯以解表裏之邪復津液而助陽也

柴胡桂枝乾薑湯方

第五十五

柴胡 半斤。味苦平。 桂枝 三兩。去皮。味辛熱。 乾薑 三兩。味辛熱。

括蕒根 四兩。味苦寒。 黃芩 三兩。味苦寒。 牡蠣 三兩。熬。味酸寒。

甘草 二兩。炙。味甘平。

右七味以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。復服汗出便愈。

內經曰。熱淫於內。以苦發之。柴胡黃芩之苦。以解傳表之邪。辛甘發散。為陽。桂枝甘草之辛甘。以散在表之邪。以炙之。牡蠣之鹹。以消胸脇之滿。辛以潤之。乾薑之辛。以固陽虛之汗。津液不足而為

渴苦以堅之。括糞之苦。以生津液。

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞭。脉細者。此爲陽微結。必有表復有裏也。脉沉亦在裏也。汗出爲陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此爲半在裏半在外也。脉雖沉緊。不得爲少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與小柴胡湯。設不了了者。得屎而解。

傷寒五六日。邪當傳裏之時。頭汗出。微惡寒者。表仍未解也。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞭。脉細

者邪結於裏也。大便鞅爲陽結。此邪熱雖傳於裏。然以外帶表邪則熱結猶淺。故曰陽微結。脈沉雖爲在裏。若純陰結則更無頭汗惡寒之表證。諸陰脈皆至頸胸中而還不上。謂頭。今頭汗出。知非少陰也。與小柴胡湯以除半表半裏之邪。服湯已。外證罷而不了了者。爲裏熱未除。與湯取其微利。則愈。故云得屎而解。

傷寒五六日。嘔而發熱者。柴胡湯證。其而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不爲逆。

必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此爲結胸也。大陷胸湯主之。但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯。

傷寒五六日邪在半表半裏之時嘔而發熱邪在半表半裏之證是爲柴胡證具以他藥下之柴胡證不罷者不爲逆却與柴胡湯則愈若下後邪氣傳裏者邪在半表半裏則陰陽俱有邪至於下後邪氣傳裏亦有陰陽之異若下後陽邪傳裏者則結於胸中爲結胸以胸中爲陽受氣之分與大陷

胸湯以下其結陰邪傳裏者則留於心下為痞以  
心下為陰受氣之分與半夏瀉心湯以通其痞經  
曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰  
而反下之因作痞此之謂也

半夏瀉心湯方 第五十六

半夏 半升洗 黃芩 苦寒 乾薑 辛熱

人參 已上各三兩 黃連 一兩 大棗 十二枚

甘草 二兩炙

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服

一升。日三服。

辛入肺而散氣。半夏之辛以散結氣。苦入心而泄熱。黃芩黃連之苦以瀉痞熱。脾欲緩。急食甘以緩之。人參甘草大棗之甘以緩之。

太陽少陽併病。而反下之。成結胸。心下鞅。下利不止。水漿不下。其人心煩。

太陽少陽併病。為邪氣在半表半裏也。而反下之。二經之邪乘虛而入太陽表。邪入裏。結于胸中。為結胸。心下鞅。少陽裏邪乘虛下于腸胃。遂利不止。

若邪結陰分則飲食如故而爲藏結此爲陽邪內結故水漿不下而心煩

脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

浮而緊浮爲傷陽緊爲傷陰發其汗而反下之若浮入裏爲陽邪入裏則作結胸浮不入裏而緊入裏者陰邪入裏則作痞

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漉漉汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣

汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

下利嘔逆裏受邪也邪在裏者可下亦須待表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時不惡寒者表已解也頭痛心下痞鞅滿引脇下痛乾噎短氣者邪熱內畜而有伏飲是裏未和也與十棗湯下熱逐飲

十棗湯方

第五十七

芫花

熬味辛苦

甘遂

苦寒

大戟

苦寒

大棗

十枚擘

右三味等分。各別搗爲散。以水一升半。先煮大棗肥者十枚。取八合。去滓。內藥末。強人服一錢七。羸人服半錢。溫服之。平旦服。若下少。病不除者。明日更服。加半錢。得快。下利後。糜粥自養。

辛以散之。芫花之辛。以散飲。苦以泄之。甘遂大戟之苦。以泄水。水者。腎所主也。甘者。脾之味也。大棗之甘者。益土而勝水。

杜壬云。裏未和者。蓋痰與燥氣。壅于中焦。故頭疼。乾嘔。短氣。汗出。是痰膈也。非十棗不治。但此湯不

宜輕用。恐損人於倏忽。用藥者慎之。

太陽病。醫發汗。遂發熱惡寒。因復下之。心下痞。表裏俱虛。陰陽氣並竭。無陽則陰獨。復加燒針。因胸煩面色青黃。膚暍者難治。今色微黃。手足溫者易愈。

太陽病。因發汗。遂發熱惡寒者。外虛陽氣。邪復不除也。因復下之。又虛其裏。表中虛邪。內陷傳於心下。爲痞。發汗表虛爲暍。陽下之裏虛爲暍。陰表證罷。爲無陽。裏有痞。爲陰獨。又加燒針。虛不勝火。火氣內攻。致胸煩也。傷寒之病。以陽爲主。其人面色

青。膚肉。鬬動者。陽氣太虛。故云難治。若面色微黃。手是溫者。卽陽氣得復。故云易愈。

心下痞按之濡。其脈關上浮者。大黃黃連瀉心湯主之。

心下鞭按之痛。關脈沉者。實熱也。心下痞按之濡。其脈關上浮者。虛熱也。大黃黃連湯以導其虛熱。

大黃黃連瀉心湯方 第五十八

大黃

二兩味苦寒

黃連

一兩味苦寒

右二味以麻沸湯二升漬之。須臾絞去滓。分溫再服。

內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以麻沸湯漬服者取其氣薄而泄虛熱

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

心下痞者虛熱內伏也惡寒汗出者陽氣外虛也與瀉心湯攻痞加附子以固陽

附子瀉心湯方 第五十九

大黃 二兩  
黃連

黃芩 各一兩  
附子 一枚炮去皮

破別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾緩去滓內  
附子汁分溫再服

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口  
燥煩小便不利者五苓散主之。

本因下後成痞當與瀉心湯除之若服之痞不解  
其人渴而口燥煩小便不利者爲水飲內畜津液  
不行非熱痞也與五苓散發汗散水則愈一方忍  
之一日乃愈者不飲水者外水不入所停之水得  
行而痞亦愈也

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭膈下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之。

胃爲津液之主陽氣之根大汗出後外亡津液胃中空虛客氣上逆心下痞鞭金匱要畧日中焦氣未和不能消穀故令噫乾噫食臭者胃虛而不殺穀也膈下有水氣腹中雷鳴土弱不能勝水也與瀉心湯以攻痞加生薑以益胃。

生薑瀉心湯方 第六十一

生薑 四兩切。

甘草 三兩炙。

人參 三兩。

乾薑 一兩。

黃芩 三兩。

半夏 半升。  
洗。

黃連 一兩。

大棗 十二枚。

右八味以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

傷寒中風醫反下之。其人下利。日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞅而滿。乾嘔。心煩不得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞅也。其草瀉心湯主之。

傷寒中風是傷寒。或中風也。邪氣在表。醫反下之。

虛其腸胃而氣內陷也。下利日數十行，穀不化，腹中雷鳴者，下後裏虛胃弱也。心下痞鞭，乾嘔心煩，不得安者，胃中空虛，客氣上逆也。與瀉心湯以攻表，加甘草以補虛。前以汗後胃虛，是外傷陽氣，故加生薑。此以下後胃虛，是內損陰氣，故加甘草。

甘草瀉心湯方

第六十一

甘草

四兩

黃芩

三兩

乾薑

三兩

半夏

半升

黃連

一兩

大棗

十二枚

右六味以水一斗，煮取六升，去滓，再煎，取三升，溫服。

一升。日三服。

成氏云。氣結而不散。壅而不得。爲結胸。陷胸湯爲  
有達之劑。寒而不通。否而不泰。爲痞。瀉心湯爲分  
解之劑。痞與結胸。有高下焉。邪結在胸中。故曰陷  
胸。留邪在心下。故曰瀉心。

沈亮宸云。半夏瀉心。甘草瀉心。皆下後傷真氣之  
過也。生薑瀉心。因于食。大黃瀉心。因于熱。附子瀉  
心。因于寒。

傷寒。服湯藥。下利不止。心下痞。鞭服瀉心湯已。復以

他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復利不止者。當利其小便。

傷寒服湯藥下後利不止而心下痞鞭者。氣虛而客氣上逆也。與瀉心湯攻之。則痞已。醫復以他藥下之。又虛其裏。致利不止也。理中丸脾胃虛寒下利者服之愈。此以下焦虛故與之。其利益甚。聖濟經曰。滑則氣脫。欲其收也。如開腸洞泄便溺遺失。澁劑所以收之。此利由下焦不約。與赤石脂禹餘

糧湯以澁洞泄下焦主分清濁下利者水穀不分也若服澁劑而利不止當利小便以分其氣

赤石脂禹餘糧湯方

第六十二

赤石脂

一斤碎味甘溫

禹餘糧

一斤碎味甘平

已上二味以水六升煮取二升去滓三服

本草云澁可去脫石脂之澁以收斂之重可去怯餘糧之重以鎮固之

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝咽喉眩暈經脉動惕者久而成痿

傷寒吐下後發汗。則表裏之氣俱虛。虛煩。脈甚微。爲正氣內虛。邪氣獨在。至七八日。正氣當復。邪氣當罷。而心下痞。脇下痛。氣上衝。咽疾。眩。冒者。正氣內虛而不復。邪氣留結而不去。經脈動惕者。經絡之氣虛極。久則熱氣還經。必成痿弱。

傷寒發汗。若吐若下。解後。心下痞。噯氣不除者。旋復代赭石湯主之。

大邪雖解。以曾發汗吐下。胃氣弱而未和。虛氣上逆。故心下痞。噯氣不除。與旋復代赭石湯降虛。

氣而和胃。

旋復代赭石湯方

第六十三

旋復花

三兩。味鹹。溫。

人參

二兩。味甘。溫。

生薑

五兩。切。味辛。溫。

半夏

半升。洗。味辛。溫。

代赭石

一兩。味苦。寒。

大棗

十二枚。味甘。溫。

甘草

三兩。炙。味甘。平。

右件七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫

服一升。日三服。

鞭則氣堅。戩味可以奠之。旋復之藥。以奠痞鞭。虛則氣浮。重劑可以鎮之。代赭石之重。以鎮虛逆。辛

者散也。生薑半夏之辛。以散虛痞。甘者緩也。人參  
甘草大棗之甘。以補胃弱。

婁氏云。病解後。心下痞。噫氣。若不下利者。此條  
旋覆代赭石湯也。若下利者。前條生薑瀉心湯也。  
下後不可更行桂枝湯。若汗出而喘。無大熱者。可與  
麻黃杏子甘草石膏湯。

前第三卷十六證云。發汗後。不可更行桂枝湯。汗  
出而喘。無大熱者。爲與此證治法同。汗下雖殊。旣  
不當損正氣。則一邪氣所傳旣同。遂用一法治之。

經所謂若發汗。若下。若吐後。是矣。

太陽病。外證未除。而數下之。遂協熱而利。利下不止。心下痞鞭。表裏不解者。桂枝人參湯主之。

外證未除。而數下之。爲重虛其裏。邪熱乘虛而入。裏虛協熱。遂利不止。而心下痞。若表解而下利。心下痞者。可與瀉心湯。若不下利。表不解。而心下痞者。可先解表。而後攻痞。以表裏不解。故與桂枝人參湯。和裏解表。

桂枝人參湯方

第六十四

桂枝

四兩去皮  
味辛熱

甘草

四兩炙  
味甘平

白朮

三兩味  
甘平

人參

三兩味  
甘溫

乾薑

三兩味  
辛熱

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升溫服一升日再夜一服。

表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏

氣大虛表裏不解故加桂枝甘草於理中湯也。

張兼善云大柴胡湯瀉也桂枝人參湯補也皆治

下利心下痞鞭若傷寒發熱汗出不解心下痞鞭

嘔吐而下利者表和而裏病也以心中痞鞭故為

實當以大柴胡湯下之。二者心下痞，雖同而虛實之症有異，故用藥有攻補之別也。

傷寒大下後復發汗，心下痞，惡寒者，表未解也，不可攻痞，當先解表，表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯，攻痞宜大黃黃連瀉心湯。

大下後復發汗，則表裏之邪當悉已。此心下痞而惡寒者，表裏之邪俱不解也。因表不解而下之，爲心下痞。先與桂枝湯解表，表解乃與大黃黃連瀉心湯攻痞。內經曰：從外之內而盛於內者，先治其

外而後調其內。

活人云大抵結胸與痞皆應下然表未解者不可攻也。

傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之。

傷寒發熱寒已成熱也汗出不解表和而裏病也吐利心腹濡裏爲裏虛嘔吐而下利心腹痞鞭者是裏實也與大柴胡湯以下裏熱。

病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞鞭氣

上衝咽喉不得息者此爲胸有寒也當吐之宜瓜蒂散。

病如桂枝證爲發熱汗出惡風言邪在表也頭痛項強爲桂枝湯證具若頭不痛項不强則邪不在表而傳裏也浮爲在表沉爲在裏今寸脈微浮則邪不在表亦不在裏而在胸中也胸中與表相應故知邪在胸中者猶如桂枝證而寸脈微浮也以胸中痞鞅上衝咽喉不得息知寒邪客於胸中而不在表也千金曰氣浮上部填塞心胸胸中滿者

吐之則愈與瓜蒂散以吐胸中之邪。

瓜蒂散方

第六十五

瓜蒂

一分熬黃  
末若其

赤小豆

一分末

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香豉  
一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服  
之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與  
瓜蒂散。

其高者越之越以瓜蒂豆豉之苦在上者湯之湯  
以赤小豆之酸內經曰酸苦湯泄為陰。

病脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名藏結死

素有宿昔之積結於脇下爲痞今因傷寒邪氣入裏與宿積相助使燕之真氣結而不通致連在臍傍痛引少腹入陰筋而死。

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加入參湯主之。

若吐若下後七八日則當解復不解而熱結在裏。

表熱者身熱也裏熱者內熱也本因吐下後邪氣乘虛內陷爲結熱在無表熱而純爲裏熱則邪熱結而爲實此以表熱未罷時時惡風若邪氣純在表則惡風無時若邪氣純在裏則更不惡風以時時惡風知表裏俱有熱也邪熱結而爲實者則無大渴邪熱散漫則渴今雖熱結在裏表裏俱熱未爲結實邪氣散漫熏蒸焦隔故大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升與白虎加人參湯散熱生津

傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參

湯主之。

無大熱者爲身無大熱也。口燥渴心煩者。當作陽明病。然以背微惡寒。爲表未全罷。所以屬太陽也。背爲陽。背惡寒。口中和者。少陰病也。當與附子湯。今日燥而渴。背雖惡寒。此裏也。則惡寒亦不至甚。故云微惡寒。與白虎湯。加表散熱。即人參。止渴生津。

吳氏云。有喜辛寒。解足陽明經本熱。蒸蒸發熱。潮熱。裏背熱。舌燥。煩渴之聖藥也。且時時者。時或。

惡風而不常也。背上一惡者，但覺微惡而不甚也。所有盛熱躁渴而用，則無疑矣。若夫表證惡寒，當在背上一惡寒而不燥渴者，切不可用。

傷寒脈浮發熱無汗，其表不解者，不可與白虎湯。渴欲飲水，無表證者，白虎加人參湯主之。

傷寒脈浮發熱無汗，其表不解不渴者，宜麻黃湯。渴者宜五苓散，非白虎所宜。大渴欲飲水，無表證者，乃可與白虎加人參湯，以散裏熱。臨病之工，大宜精別。

太陽少陽併病。心下鞅。頸項強而眩者。當刺大椎。肺俞。慎勿下之。

心下鞅而眩者。少陽也。頸項強者。太陽也。刺大椎。肺俞。以瀉太陽之邪。而以太陽脈下項俠脊。故爾。肝俞以瀉少陽之邪。以膽爲肝之府。故爾。太陽爲在表。少陽爲在裏。明是半表半裏證。前第八證云。不可發汗。發汗則譫語。是發汗攻太陽之邪。少陽之邪。益甚于胃。以發譫語。此云慎勿下之。攻少陽之邪。太陽之邪。乘虛入裏。必作結胸。經曰。太陽少

陽併病而反下之成結胸

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

太陽陽明合病自下利爲在表當與葛根湯發汗  
陽明少陽合病自下利爲在裏可與承氣湯下之  
此太陽少陽合病自下利爲在半表半裏非汗下  
所宜故與黃芩湯以和解半表半裏之邪嘔者胃  
氣逆也故加半夏生薑以散逆氣

黃芩湯方

第六十六

黃芩

三兩。味苦寒。

甘草

二兩。味甘平。

芍藥

二兩。味酸平。

大棗

十二枚。味甘溫。

右四味以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。若嘔者。加半夏半升。生薑三兩。

虛而不實者。苦以堅之。酸以收之。黃芩芍藥之苦。酸以堅歛腸胃之氣。弱而不足者。甘以補之。甘草大棗之甘。以補固腸胃之弱。

黃芩加半夏生薑湯方

第六十七

於黃芩湯方內。加半夏半升。生薑一兩半。餘依黃

苓湯法服。

傷寒胸中有熱，胃中有邪氣，腹中痛，欲嘔吐者，黃連湯主之。

濕家下後，舌上如胎者，以丹田有熱，胸中有寒，是邪氣入裏，而爲下熱上寒也。此傷寒邪氣傳裏，而爲下寒上熱也。胃中有邪氣，使陰陽不交，陰不得升，而獨治於下，爲下寒；腹中痛，陽不得降，而獨治於上，爲胸中熱。欲嘔吐，與黃連湯，升降陰陽之氣。

黃連湯方

第六十八

黃連 味苦寒 甘草 多味 乾薑 味辛熱

桂枝 去心味辛熱各三兩 人參 二兩味甘溫 半夏 半升洗

大棗 十二枚擘 味甘溫

右七味以水一斗。煮取六升。去滓。溫服一升。日三服。

夜二服。

上熱者泄之。以苦黃連之苦。以降陽。下寒者散之。以辛桂薑半夏之辛。以升陰。脾欲緩。急食甘以緩之。人參甘草大棗之甘。以益胃。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔。

不渴，脈浮虛而濇者，桂枝附子湯主之。

傷寒與中風家，至七八日再經之時，則邪氣多在裏，身必不苦疼痛，今日數多，復身體疼痛，煩不能自轉側者，風濕相搏也。煩者，風也，身疼不能自轉側者，濕也。經曰：風則浮虛，脈經曰：脈來濇者為病寒濕也。不嘔不渴，裏無邪也。脈得浮虛而濇，身有疼痛，知風濕但在經也。與桂枝附子湯以散表中風濕。

若其人大便鞭，小便自利者，去桂枝加白朮湯主之。

桂發汗走津液此小便利大便鞭為津液不足去桂加木

桂枝附子湯方 第六十九

桂枝

三兩 去皮 味辛 熱

附子

三枚 炮 去皮 破 八片 味辛 熱

生薑

三兩 切 味辛 溫

甘草

二兩 炙 味甘 溫

大棗

十二枚 擘 味甘 溫

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

風在表者散以桂枝甘草之辛其濕在經者逐以

附子之辛熱薑棗辛甘行榮衛通津液以和表也

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗

出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草  
附子湯主之

風則傷衛濕流關節風濕相搏兩邪亂經故骨節  
疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇也風勝則衛氣  
不固汗出短氣惡風不欲去衣爲風在表濕勝則  
水氣不行小便不利或身微腫爲濕外薄也與甘  
草附子湯散濕固衛氣

甘草附子湯方 第七十一

甘草

二兩炙  
味甘平

附子

二枚炮去皮  
破味辛熱

白朮

二兩 乘 其溫

桂枝

四兩 去皮 味辛熱

右四味以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。初服得微汗，則解，能食，汗出復煩者，服五合，恐一升多者，宜服六七合者為妙。

桂枝，甘草之辛，其發散風邪而固衛，附子、白朮之辛，其解濕氣而溫經。

活人云：身腫者，加防風一兩，悸氣、小便不利者，加白茯苓一兩半。

傷寒脈浮滑，此表有熱，裏有寒，白虎湯主之。

浮爲在表，潛爲在裏。表有熱，外有熱也；裏有寒，有邪氣傳裏也。以邪未入府，故止言寒如瓜蒂散證。云胸上有寒者是矣。與白虎湯以解內外之邪。

白虎湯方

第七十一

知母

六兩，味苦寒。

石膏

一斤，味甘寒。

甘草

二兩，味甘平。

粳米

六合，味甘平。

右四味以水一斗，煮米熟湯成，去滓，溫服一升，日三服。

內經曰：熱淫所勝，佐以苦甘。知母石膏之苦，甘以

散熱熱則傷氣非以緩之甘草粳米之甘以益氣  
成氏云白虎西方金神也應秋而歸肺熱甚于內  
者以寒下之熱甚于外者以涼解之其有中外俱  
熱內不得泄外不得發非是湯則不能解暑暍之  
氣得秋而止故曰處暑是湯以白虎名謂能止熱  
也

李東垣云身以前胃之經也胸胃肺之室也邪在  
陽明肺受火制故用辛寒以清肺所以號爲白虎  
也

王三陽云。經文寒字。當邪字解。亦熱也。

傷寒脉結代。心動悸。炙甘草湯主之。

結代之脉。動而中止。能自還者。名曰結。不能自還者。名曰代。由血氣虛衰。不能相續也。心中悸動。知

真氣內虛也。與炙甘草湯。益虛補血氣而復脉。

炙甘草湯方 第七十二

甘草 四兩炙 生薑 三兩切 桂枝 三兩去皮

人參 二兩 味 生地黄 一斤 味 阿膠 二兩 味

麥門冬 半升去心 麻子仁 半升 味

大棗

十二枚。味甘。性溫。

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓  
肉膠烱消盡溫服一升日三服一名復脈湯

補可以去弱人參甘草大棗之甘以補不足之氣  
桂枝生薑之辛以益正氣聖濟經曰津液耗散爲  
枯五藏痿弱榮衛澗流劑所以潤之麻仁阿膠麥  
門冬地黃之甘潤經益血復脈通心也

脈按之來緩而時一止復來者名曰結又脈來動而  
中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脈來動

而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者必難治。

結代之脉一為邪氣留結一為真氣虛衰脈來動而中止若能自還更來小數止是邪氣留結名曰結陰若動而中止不能自還因其呼吸陰陽相引復動者是真氣衰極名曰代陰為難治之脉經曰脉結者生代者死此之謂也。